

зала 20
шкафъ 53.
полка 1.
№ 42.

Капуста Истобенка.

Истобенка упоминается въ старыхъ годахъ «Вѣстника Садо-водства» во время редакціи В. Е. Волкенштейна, но о ней не даётся тэмъ никакихъ свѣдѣній. Оказывается, что этотъ сортъ, присланный мнѣ въ сѣменахъ для изслѣдованія, есть сортъ народный, существующій и по сіе время и имѣющій свою несложную исторію

Название свое Истобенка получила отъ села Истобенского, Орловскаго уѣзда, Вятской губерніи, гдѣ она съ незапамятныхъ временъ разводится въ большомъ количествѣ. Въ губерніяхъ горно- заводскаго пространства, особенно въ Вятской, Пермской и Уфимской, городный промыселъ, вслѣдствіе пѣразвитія садоводства, имѣть первенствующее значеніе; причемъ капуста вмѣстѣ съ лукомъ и огурцами получила большой и выгодный сбытъ, который расширяется теперь благодаря желѣзной дорогѣ. Но еще до этого времени Истобенская капуста славилась своими хорошими качествами на всемъ сѣверѣ Вятской губерніи, имѣя большой сбытъ въ уѣзды Вятскій, Орловскій и Котельническій. Разводится она въ селѣ Истобенскомъ крестьянами, составляя ихъ главный источникъ пропитанія, такъ какъ они, за недостаткомъ пахатной земли, хлѣбопашествомъ здѣсь не занимаются. Садить эту капусту на грядахъ въ $1\frac{1}{2}$ аршина ширины и въ сухое время лѣтомъ постоянно поливаются, потому что безъ поливки совсѣмъ не образуется кочанъ; однако, на низменныхъ мѣстахъ съ сырватою почвою Истобенка удается даже безъ поливки при посадкѣ не на грядахъ, а на широкихъ «загонахъ» отъ 1 до $2\frac{1}{2}$ саж. ширины. О такой культурѣ сообщаетъ мнѣ лицо, приславшее сѣмена этой капусты, какъ о способѣ, примѣненномъ имъ впервые на сырватой песчаной почвѣ, сильно удобренной конскимъ навозомъ съ осени и весною. Растенія при этомъ способѣ культуры составляли предметъ общаго удивленія окрестныхъ крестьянъ и дали въ сухое лѣто 1892 г. богатый урожай, который, очевидно, кромѣ влаги почвы и способа культуры, нужно приписать въ сильной степени и обильному удобренію, весьма благопріятному для роста всякихъ кочанныхъ капустъ.

Истобенка считается местнымъ сортомъ, выработавшимся подъ влияниемъ климатическихъ условий съверной части Вятской губерніи. Въ своей местности она родится лучше выписанныхъ сортовъ, оказывающихся или требовательными на почву, или слишкомъ поздними для Орловскаго уѣзда. Въ послѣднее время чистый сортъ ея сталъ встрѣчаться весьма рѣдко, смѣшившись съ различными выписанными ранними сортами, отчего въ урожаѣ Истобенки попадаются растенія, похожія то на Іоркскую капусту, то на Бычье Сердце; поэтому чистый сортъ удается достать только съ большимъ трудомъ. Оказывается, что местное земство приняло на себя особенную заботу о распространеніи между Истобенскими крестьянами выписанныхъ сѣмянъ иностранныхъ сортовъ, но крестьяне, получивъ такія сѣмена, не оставили своего старого сорта, который такимъ образомъ подвергнулся помѣси въ сѣмянникахъ.

Является вопросъ: самостоятельенъ ли этотъ сортъ капусты и въ какихъ отношеніяхъ онъ находится къ другимъ сортамъ, какъ русскимъ, такъ и заграничнымъ? Такой вопросъ былъ поставленъ мнѣ для разрѣшенія. Отвѣтить на него я не могъ сейчасъ же и съ 1894 года въ теченіе пяти лѣтъ высѣивалъ сѣмена, наблюдая главнымъ образомъ влияніе на растенія неблагопріятной погоды. Такъ какъ юльская или августовская засуха у насъ явленія нерѣдкія, то мнѣ нѣсколько разъ приходилось убѣдиться, что въ этомъ отношеніи Истобенская капуста не представляетъ никакой исключительной требовательности на поливку: у насъ капуста поливается только послѣ посадки, а затѣмъ лѣтомъ пользуется лишь выпадающими дождями. Можетъ быть, въ Орловскомъ уѣздѣ иная условія погоды, но у насъ послѣ засухи растенія, вошедшія въ ростъ, долго не завиваются кочновъ, и только съ дождями въ концѣ августа начинается ихъ настоящее развитіе, которое благополучно довершается къ концу сентября и продолжается даже послѣ первого осеннаго заморозка, бывающаго 12 сентября и позднѣе. Такія растенія представляла собою и Истобенка, которую нельзя отнести ни къ раннимъ, ни къ позднимъ сортамъ; ранніе сорта у насъ при благопріятныхъ условіяхъ даютъ кочны 7—15 юля, прежде, чѣмъ начнется засуха, останавливающая ихъ ростъ или ведущая къ проростанію и тресканію кочана. Развитіе кочановъ у Истобенки, выращенной изъ присланныхъ сѣмянъ въ разные годы, всегда было весьма неравномѣрное, хотя растенія, по всѣмъ видимымъ признакамъ, были односортныя, за исключеніемъ случайныхъ помѣсей: многія изъ нихъ имѣли дурной ростъ, были слабы и давали малые кочны, тогда какъ другія отличались лучшими свойствами. Это различіе между выращива-

емыми растеніями Россіи, не только воздѣлываемыми правильности сѣмени, обратить самое сѣмени на сѣмена безъ разбора растенія, отдѣляютъ даже качествами роста. Если къ этому промѣсь иныхъ сортовъ (Іоркская капуста Сабуровка), то можетъ быть образный составъ кивается огородникомъ капусту.

Выдѣля въ также помѣси и въ причинѣ растенія, которому, на мой пусты, средней въ плоскокочанныхъ въ мѣтная, такъ что среднимъ. Только стоящіе безъ черенка эта капуста отличаются нею болѣе компактнѣе, очень широкими жилками, по боковымъ у Каширки или Стѣнѣ слѣдуетъ въ изогнутыхъ, дѣлающихъ растеній эти листьями, рѣзко выступающими, полагать, отъ Голландии, отъ половины августа, достаточно плотны и грубыми, но попавшими въ кочномъ, капустѣ средняго вышина 3—4 въ снаружи блѣзелемъ.

выработавшимся
части Вятской
выписанныхъ
очву, или слиш-
къ время чистый
внись съ раз-
урожаѣ Исто-
ю капусту, то
достать только
емство приняло
Истобенскими
и, но крестьяне,
го сорта, кото-
янникахъ.

ртъ капусты и
сортамъ, какъ
ль поставленъ
сейчасъ же и
ь сѣмена, на-
неблагопріятной
засуха у насъ
ось убѣдиться,
представляеть
ивку: у насъ
лѣтомъ поль-
зъ Орловскомъ
ухи растенія,
только съ до-
щее развитіе,
и продолжавшаго 12
бою и Исто-
къ позднимъ
новіяхъ даютъ
а, остановли-
танію кочана.
аныхъ сѣ-
брное, хотя
сортины, за-
мѣли дурной
какъ другія
выращива-

емыми растеніями представляетъ самое обыкновенное явленіе въ Россіи, не только по отношенію къ капустамъ, но и ко всяkimъ воздѣльываемымъ растеніямъ, и оно такъ важно для соображеній о правильности сѣмянныхъ культуръ, что на него давно слѣдуетъ обратить самое серіозное вниманіе. Причина его — дурной выборъ растеній на сѣмена: обыкновенно въ качествѣ сѣмянниковъ садятъ безъ разбора растенія какъ хорошія, такъ и дурныя, и часто не отдѣляютъ даже особенно отличившіяся какими либо полезными качествами роста, выносливости, лучшаго склада кочновъ и пр. Если къ этому прибавить также безъ разбора культивируемую примѣсь иныхъ сортовъ (изъ сѣмянъ у меня выходили не только Іоркская капуста и Бычье Сердце, но также Голландская и даже Сабуровка), то можно легко объяснить смѣшанный, крайне разнообразный составъ растеній и всю ту трудность, съ которою сталкивается огородникъ, пожелавшій отыскать настоящую Истобенскую капусту.

Выдѣляя въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ разныя примѣси, а также помѣси и неудавшіяся или искаженные отъ неизвѣстныхъ причинъ растенія, я получалъ ежегодно небольшой остатокъ, въ которомъ, па мой взглядъ, замѣчается особый сортъ русской капусты, средней по своему поспѣванію, относящейся къ группѣ плоскокочаныхъ капустъ. Ножка у этого сорта короткая, незамѣтная, такъ что растеніе кажется коренастымъ, по величинѣ среднимъ. Только нижніе небольшіе листья — черешковые, выше стоящіе безъ черешковъ, съ широкими боковыми лопастями, чѣмъ эта капуста отличается отъ Каширки, представляя сравнительно съ нею болѣе компактную форму. Наружные листья большиe, сидячіе, очень широкіе, плоскіе или слегка вогнутые вдоль главной жилки, по боковымъ жилкамъ складчатые, сизовато-зеленые, какъ у Каширки или Сабуровки, или менѣе сизые, чѣмъ у нихъ. Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько прикочанныхъ листьевъ, чашеобразно-вогнутыхъ, дѣлающихъ постепенно болѣе къ кочну; у другихъ растеній эти листья плоскіе, зеленые, безъ сизаго налета, съ бѣлыми, рѣзко выступающими жилками (это различіе зависить, надо полагать, отъ Голландской капусты). Кочны начинаютъ готовиться отъ половины августа, но въ это время не всѣ бываютъ достаточно плотны и годны къ употребленію; нѣкоторые держатся еще рыхлыми, но попадаются растенія съ такимъ хорошо сформированнымъ кочномъ, какой рѣдко бываетъ у лучшихъ заграничныхъ капустъ средняго поспѣванія. Ширина кочна 5—6 вершковъ, высота 3—4 вершка; по формѣ онъ плоскій, хлѣбообразный, снаружи блузеленый, рѣзко выдѣляющійся, какъ у Сабуровки,

кочанъ которой онъ какъ бы повторяетъ въ меньшемъ размѣрѣ. Дѣстоинство кочна лучше, чѣмъ у Каширки, но хуже Сабуровки, т. е. онъ не даетъ такого нѣжнаго овоща, какъ послѣдніяя, но можетъ замѣнять ее. Вообще, это сортъ хозяйственный, довольно выгодный; особенно при частой посадкѣ, которая такъ долюбливается крестьянами.

Горки Могилев. губ.

М. Рытовъ



Дозволено цензурою. Спб. 22 Декабря 1900 г.

Типографія Спб. Градоначальства, Измайловскій полкъ, 8 рота. д. № 20

И. Д. Г. С.
100