

З М Е С Т

Уводзіны	3
Падрыхтоўка грубых кармоў	5
Запарванне саломы і мякіны	6
Саманаграванне саламянай сечкі	7
Апрацоўка саломы вапнай	10
Содава-сольвы спосаб апрацоўкі саломы	11
Апрацоўка сечкі шчолачамі	12
Хіміка-біялагічны метады апрацоўкі азімай саломы	14
Як рыхтуюцца сенная мука і вітаміннае сена	15
Як рыхтаваць санны настой	16
Падрыхтоўка да скормлівання хваёвых лапак	13
Падрыхтоўка сакавітых кармоў і адходаў тэхнічнай вытворчасці	19
Падрыхтоўка да скормлівання	
коранеклубеньяплодаў	20
Падрыхтоўка да скормлівання сіласу	20
Падрыхтоўка да скормлівання брагі і жамерынаў	21
Падрыхтоўка канцэнтраваных кармоў	22
Як рыхтуюцца баўтуха, кісель і каша	23
Варка, прапарванне і падсмажванне зерня	24
Абязгорчванне зерня лубіну	24
Падрыхтоўка макухі да скормлівання	25
Ужыванне мінеральных падкормак	25

У В О Д З І Н Ы

Перад калгасамі і саўгасамі пастаўлена цяпер вялікая і адказная задача — у бліжэйшыя гады дагнаць Злучаныя Штаты Амерыкі па вытворчасці мяса, масла і малака на душу насельніцтва.

У адказ на заклік Камуністычнай партыі працаўнікі сельскай гаспадаркі Беларусі ўключыліся ва ўсенароднае сацыялістычнае спаборніцтва за рэзкае павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Каб паспяхова вырашыць гэтую задачу, неабходна ў 1958 годзе давесці вытворчасць на 100-гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў: малака — да 145 цэнтнераў, мяса ў жывой вазе — да 30 цэнтнераў, у тым ліку свініны на 100 гектараў ворнай зямлі — да 24 цэнтнераў. Надой малака ў сярэднім на фуражную карову павінен скласці: у калгасах — не менш чым 1.900 кілаграмаў, у саўгасах — не менш чым 2.700 кілаграмаў. Неабходна таксама мець у калгасах і саўгасах Беларусі на 100 гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў 18 галоў буйнай рагатай жывёлы, у тым ліку 8 кароў, да 14 авечак, не менш чым 20 свіней на 100 гектараў ворнай зямлі і 70 штук птушкі на 100 гектараў пасаваў збожжавых.

Вялікае значэнне ў далейшым павышэнні прадуктыўнасці грамадскай жывёлагадоўлі мае правільная арганізацыя кормлення і падрыхтоўка кармоў, асабліва ў стойлавы перыяд. Ужыванне розных метадаў апрацоўкі і падрыхтоўкі кармоў да скормлівання дае магчымасць палепшыць іх смакавыя якасці, страўнасць і пажыўнасць. Пры некаторых спосабах апрацоўкі крыху папсаваныя кармы аб'ясшқоджваюцца, у іх разбураюцца шкодныя плесневыя грыбкі і насенне ядавітых раслін.

У выніку апрацоўкі і падрыхтоўкі кармоў дасягаецца больш эканомнае выдаткаванне іх, што змяншае затраты на адзінку прадукцыі і зніжае яе кошт.

ПАДРыхтоўка ГРУБых КАРМОУ

У стойлавы перыяд добрае сена з'яўляецца незаменнай крыніцай вітамінаў і некаторых мінеральных рэчываў для ўсёй сельскагаспадарчай жывёлы. Дабраякасным сенам перш за ўсё павінны быць забяспечаны маладняк, цяжарная, племянная жывёла, каровы з высокім надоем, а таксама коні ў перыяд цяжкай работы. Добрае сена звычайна даецца жывёле без усякай падрыхтоўкі. Сена грубасцябловае, буйнаасаковае часта даецца ў выглядзе сечкі. Свініям рэкамендуецца даваць сенную муку.

У стойлавы перыяд у кармавым балансе нашых гаспадарак значнае месца займае яшчэ азімая саломы. Звычайна жывёла неахвотна есць яе. Да таго ж саломы дрэнна ператраўляецца. Таму падрыхтоўка такой саломы з мэтай паляпшэння яе смакавых якасцей з'яўляецца вельмі важным мерапрыемствам, якое павышае прадуктыўнасць жывёлагадоўлі.

Яравая саломы збожжавых і бабовых культур мае менш клетчаткі і кремневай кіслаты. Гэтая саломы лепш ператраўляецца, чым азімая, і яе даюць жывёле ў невялікіх дозах, без папярэдняй падрыхтоўкі.

Ужываюцца наступныя прыёмы падрыхтоўкі саломы і мяккіны да скормлівання: рэзка, запарванне, заварванне, саманаграванне, запраўляння. Гэта паляпшае смак саломы, палягчае перажоўванне, павышае апетыт у жывёлы, скарачае страгі пры скормліванні. Для павышэння страўнасці і пажыўнасці саломы яе падвяргаюць больш складанай хімічнай апрацоўцы вапнай і слабымі растворамі кіслот і шчолачаў.

Перад падрыхтоўкай кармоў любым з названых спосабаў салому здрабняюць на сячкальні або саломасіласарэзцы. Для буйнай рагатай жывёлы і авечак даўжыня сечкі павінна быць 3—4 сантыметры, для коней — 2—3. Здрабняць салому трэба

так, каб жывёла не магла глытаць яе без перажоўвання. Дробная сечка пры глытанні без перажоўвання можа выклікаць калацце ў коней, а ў кароў — атонію рубца (накапленне газаў) і спыненне жвачкі.


ЗАПАРВАННЕ САЛОМЫ І МЯКІНЫ

Саламяную сечку або мякіну ўкладваюць пластамі па 20 — 30 сантыметраў у чаны або шчыльныя скрыні і кожны пласт абліваюць варам. На 100 кілаграмаў саломы выдаткоўваецца 100 літраў вару. Запоўненую скрыню або чан закрываюць шчыльнай накрывкай і кладуць на яе цяжар. Праз 10 — 12 гадзін салома гатова да скормлівання. Пры гэтым яна размякчаецца, набывае прыемны пах. Салома вымаецца са скрыні, запраўляецца мучністымі кармамі, соллю і даецца жывёле.

Сечку можна таксама запарваць і гарачай брагай, пры гэтым яе трэба браць у чатыры разы больш, чым вады. Перад запарваннем да сечкі таксама можна падмешваць караняплоды і бульбу. Сечку запарваюць толькі на адну дачу. Пры доўгім хаванні (больш чым 24 гадзіны) яна пракісае і траціць свае смакавыя якасці.

Пры запарванні сечка і мякіна лепш размякчаюцца, пры гэтым салома, калі на ёй ёсць грыбкі, абясшкодзваецца. Запарваюць сечку або мякіну ў абліцаваных ямах або драўляных шчыльных скрынях, па дне якіх пракладзены трубы з адтулінамі для выхаду пары. Пара падаецца пры дапамозе шланга ад параўтваральніка. Калі на ферме няма кармазапарніка, дык запараны корм можна падвозіць у бястарках або ў запарных скрынях, устаноўленых на санях або аўтамашынах.

Сечку або мякіну змяшчаюць у бястарку або запарную скрыню пластамі па 20 — 30 сантыметраў. Кожны пласт змочваюць падсоленай вадой з разліку на 100 кілаграмаў корму 80 — 100 літраў вады і 250 — 500 грамаў кухоннай солі. Для паліпшэння смакавых якасцей да сечкі або мякіны дадаюць здробненыя караняплоды або бульбу. Корм добра перамешваюць. Напоўненую бястарку або запарную скрыню закрываюць накрывкай, затым шлангам далучаюць да кармазапарніка або лакамабіля для прапускання пары. Запарванне працягваецца 30 — 40 мінут пасля напаўнення скрыні парай (рыс. 1).



Рыс. 1. Бястарка для запарвання грубых кармоў.


У калгасе імя Калініна Нясвіжскага раёна для запарвання грубых кармоў зроблена драўляная камера, куды змяшчаюць крацістыя скрыні з сечкай або мякінай. Пара ў камеру паступае в параўтваральніка «КМ-1600» канструкцыі Інстытута механізацыі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі Акадэміі сельскагаспадарчых навук БССР. Запарванне працягваецца 30 мінут пасля напаўнення запарніка парай, затым сечка застаецца закрытай яшчэ на 10 — 12 гадзін. (рыс. 2).

Сутачная норма прапаранай саломы для буйнай рагатай жывёлы ў перыяд адкорму — да 8 кілаграмаў, для дойных кароў — да 10.

Запараныя кармы не трэба доўгі час трымаць адкрытымі пасля ахаладжання, бо гэта прыводзіць да іх пракісання, яны пакрываюцца плесняй і псуюцца.

САМАНАГРАВАННЕ САЛАМЯНАЙ СЕЧКІ

Гэты метад падрыхтоўкі з'яўляецца найбольш простым і даступным. Ён шырока распаўсюджаны ў калгасах Мінскага раёна. Дзякуючы саманаграванню сечка набывае прыемны пах, робіцца больш мяккай, яе ахвотна есць жывёла.




Рыс. 2. Параўтваральнік «КМ-1600».

У цёплым памяшканні робяць яму або траншэю глыбінёй 1,5 метра, дзеляць іх на чатыры аддзяленні. Ёмістасць кожнага аддзялення павінна быць загадзя вызначана, з улікам штодзённай патрэбнасці ў самапрэлым корме. Адзін цэнтнер сечкі займае аб'ём 1,1 кубаметра (рыс. 3). Сцены і дно траншэі і ямы павінны быць абліцаваны дошкамі або цэглай і цэментом. Неабліцаваныя траншэі непрыгодныя, бо салома забруджваецца ад сценак, што прыводзіць да вялікіх страт корму.

Сечку ўкладваюць у яму пластамі таўшчынёй 30 — 40 сантыметраў. Кожны пласт раўнамерна змочваюць вадой, тэмпература якой павінна быць 20 — 30° Ц, з разліку 60 — 75 літ-

раў вады на цэнтнер саломы. Пасля змочвання салому старанна перамешваюць, затым шчыльна трамбуюць. Для паскарэння саманагравання ў яму дадаткова ўліваюць 2—3 вядры гарачай вады. Праз чатыры дні кожнае аддзяленне напauняецца новымі порцыямі корму.



Рыс. 3. Ямы для саманагравання саломы.

Саманаграванне саломы ў яме адбываецца хутчэй, калі да сечкі дадаюць караняплоды, вотруб'е і іншыя канцэнтраты. Карысна таксама дадаваць да сечкі сенную муку. У калгасах Магастоўскага раёна ў 1956 годзе да сечкі дадавалі кармавую муку і замест вады залівалі сечку 2 — 3-працэнтным растворам кухоннай солі. Напоўненае аддзяленне ямы або траншэі накрываецца драўляным шчытом з грузам і зверху ўцяпляецца пластам саломы або саламянымі матамі. Заложаная такім чынам сечка награвецца да 35° Ц і вышэй. На працягу чатырох дзён у ёй адбываюцца працэсы бражэння.

Не трэба закладваць для саманагравання пакрытую плесняй або гнілую салому. Каб пазбегнуць развіцця плесні, сцены і дах перыядычна беляць вапnavым малаком. Падрыхтаваную сечку даюць жывёле ў цёплым выглядзе. Саманагрэтая салома мае прыемны пах садавіны, з'яўляецца добрым кормам для дарослай буйнай рагатай жывёлы і авечак, а таксама і коней. Буйнай рагатай жывёле яе можна даваць па 12 — 15, коням — па 8 — 10 кілаграмаў у суткі.

Перад скормліваннем дадаюць кухонную соль, калі сечка не залівалася пры закладванні салёным растворам, з разліку 200 грамаў на цэнтнер корму.

АПРАЦОЎКА САЛОМЫ ВАПНАЙ

Вапнаванне заключаецца ў тым, што сечка вымочваецца ў растворы вапны, у выніку чаго яна ўзбагачаецца солямі кальцыя. Такую сечку з ахвотай есць жывёла, яна добра засвойваецца. Для вапнавання азімай саломы гэтым спосабам патрэбны скрыня, два шчыты для сцёку лішку раствору вапны і дзве бочкі: адна — для сцёку вапны, другая — для падрыхтавання вапнавага раствору (рыс. 4). На кожны цэнтнер саломы бяруць 3 кілаграмы нягашанай вапны (або 4,5 кілаграма гашанай вапны, або 9 кілаграмаў вапнавага цеста) і раствараюць у 25 літрах вады.



Рыс. 4. Вапнаванне саломы.

Падрыхтаванае вапнавае малако выліваюць у скрыню і вымочваюць у ёй сечку на працягу 5—10 мінут. Змочаную вапнавым малаком сечку выгружаюць на шчыт, па якім сцякае лішак раствору. Пасля гэтага ў скрыню загрузаюць новыя порцыі сечкі і паўтараюць гэта да таго часу, пакуль не будзе выкарыстана ўсё вапнавае малако. Пасля скрыню зноў напаўняюць вапнавым малаком і паўтараюць змочванне сечкі. На наступны дзень сечку выгружаюць на другі шчыт. Салому на шчыце трамбуюць, зноў некалькі разоў паліваюць раствором вапны і пасля вытрымлівання на шчыце на працягу сутак яе без прамывання даюць жывёле. Для вапнавання саломы можна таксама выкарыстоўваць цэментаваныя ямы. Пры гэтым пад-

рыхтаванае вапнавае малако змяшчаецца ў чан-скрыню, дзе сечка змочваецца. Затым яна ўкладваецца ў цэментаваныя ямы і выдаецца жывёле.

У суткі на кожную галаву даецца наступная колькасць апрацаванай вапнай сечкі: каровам — да 20 кілаграмаў, маладняку буйнай рагатай жывёлы — да 15 кілаграмаў, авечкам — да 3 кілаграмаў (з разліку на мокрую сечку). У пачатку жывёла часта неахвотна есць вапнавую салому. Таму першыя 2—3 дні салому запраўляюць канцэнтратамі. Пры дачы вялікай колькасці вапнавай саломы яна змешваецца з сіласам з мэтай-нейтралізацыі яго лішняй кіслотнасці свабоднай вапнай, што засталася ў саломе. Мёрзлую вапнавую салому даваць жывёле забараняецца.

Паводле даных прафесара П. А. Кормшчыкава, на вапнаванне адной тоны саломы затрачваецца 30 кілаграмаў нягашанай вапны і адзін рабочы дзень. Тона апрацаванай саломы пры скормліванні каровам дае магчымасць атрымаць дадаткова каля 80 кілаграмаў малака.

СОДАВА-СОЛЕВЫ СПАСАБ АПРАЦОЎКІ САЛОМЫ

Сечку або мякіну апрацоўваюць кальцыніраванай (вуглякіслай) содай і кухоннай соллю ў драўляных скрынях. Для гэтага патрэбны шчыльная скрыня для замочвання сечкі ў содава-селевым раствору і дзве ямы для пачарговага складвання апрацаванай сечкі або мякіны. У скрыню наліваюць 20—25 вёдзер вады, затым уліваюць растворы соды і кухоннай солі.

Раствор соды рыхтуюць так: 1 кілаграм соды раствараюць у 8—10 літрах вады. Асобна рыхтуюць раствор солі: 1 кілаграм кухоннай солі раствараюць у 5—6 літрах вады. Абодва растворы ўліваюць у скрыню з вадой. Затым у скрыні сечку вымочваюць невялікімі порцыямі, выгружаюць яе ў абліцаваную яму, ушчыльняюць і пасля 24 гадзін даюць жывёле. На цэнтнер сечкі або мякіны выдаткоўваецца 250—300 літраў раствору (20—25 вёдзер).

Апрацаваная такім спосабам саломы з'яўляецца ядрэнным кормам для буйнай рагатай жывёлы і авечак. Каровам даюць яе 20—30 кілаграмаў у суткі, маладняку буйнай рагатай жывёлы ва ўзросце звыш аднаго года — па 15—25 кілаграмаў, ад шасці месяцаў да аднаго года — па 4—10 кілаграмаў, авечкам — па 1,5—3 кілаграмы. Апрацаваную сечку неабходна ахоўваць ад прамярзання.

Паводле даных І. М. Захарчанкі (Украінскі навукова-даследчы інстытут жывёлагадоўлі), содава-селевая апрацоўка са-

ломы павялічвае яе пайданне на 35—50 працэнтаў і павышае ўдоі кароў на 7—12 працэнтаў.

АПРАЦОЎКА СЕЧКІ ШЧОЛАЧАМІ

Апрацоўка саломы або мякіны шчолачамі праводзіцца ў драўляных скрынях або абліцаваных ямах. Жалезныя катлы і чаны для апрацоўкі па гэтаму спосабу мала прыдатныя, бо яны могуць уступаць у рэакцыю з раствораў едкіх шчолачаў (рыс. 5).



Рис. 5. Апрацоўка саломы едкай шчолаччу.

У 1956 годзе ў калгасе «Чырвоная Армія» Маладзечанскага раёна паспяхова ўжывалася апрацоўка сечкі і мякіны каустычнай содай. Для гэтага ў кармакухні былі ўстаноўлены дзве драўляныя скрыні ўмяшчальнасцю па 350—450 кілаграмаў сечкі.

Па днё скрынь пракладзены тры трубы дыяметрам па 5 сантыметраў, злучаныя паміж сабой перамычкамі. Трубы, размешчаныя ў шахматным парадку, мелі адтуліны дыяметрам 5 міліметраў для выхаду пары. Трубы былі злучаны шлангам з кормазапарнікам «ЗК-0,5».

Хімічная апрацоўка кармоў праводзілася так. У драўляную бочку налівалі 200 літраў вады і дадавалі 2 кілаграмы каустычнай соды або едкай шчолачы (папярэдне растваранай у невялікай колькасці цёплай вады). Сечка ўкладвалася ў запарную скрыню паслойна (25—30 сантыметраў), ушчыльнялася і палівалася шчолачным раствораў. На 100 кілаграмаў сечкі выдаткоўвалася 200 літраў раствора шчолачы. Скрыню з сечкай закрывалі і на працягу 40 мінут праз мокрую сечку прапускалі пару. Пасля запарвання сечка заставалася ў скрыні 6—8 гадзін, затым яе давалі жывёле. Калі сечку апрацоўваць раствораў шчолачы без прапарвання, дык яе неабходна трымаць у ямах на працягу 12—18 гадзін.

Паводле даных раду аўтараў, ступень павышэння пажыўнасці саломы пры хімічнай апрацоўцы залежыць не толькі ад спосабу і характару падрыхтоўкі, але і ад канцэнтрацыі раствораў шчолачы (гл. табл. I).

Табліца I
Павышэнне пажыўнасці азімай саломы ў залежнасці ад спосабу яе падрыхтоўкі (у 100 кілаграмах корму кармавых адзінак)

Спосабы апрацоўкі	Без прапарвання	З прапарваннем
Без хімічнай апрацоўкі	20	20
Пасля хімічнай апрацоўкі:		
каустычнай содай (4 кілаграмы соды на 100 кілаграмаў сечкі)	40	60
каустычнай содай (2 кілаграмы соды на 100 кілаграмаў сечкі)	30	40
кальцыніраванай содай (1 кілаграм соды на 1 кілаграм кухоннай солі на 100 кілаграмаў сечкі)	30	40
Вапнаванне (3 кілаграмы вапны на 100 кілаграмаў сечкі)	36	50

У калгасе імя Чкалава Лёзненскага раёна летась шчолаччу апрацавалі не толькі саламяную сечку, але і здробленае асакое сена. Раствор шчолачы рыхтавалі з разліку 7—10 грамаў каустычнай соды на літр гарачай вады. Сечку і здробленае сена пасля апрацоўкі шчолаччу і прапарвання давалі жывёле ў сумесі з кукурузным сіласам.

Апрацаваная растварам шчолачы салома мае прыемны хлебны пах, яе ахвотна есць жывёла. Кароў паступова прывучаюць да апрацаванага корму, і яны з'ядаюць яго да 20 кілаграмаў у суткі.

ХІМІКА-БІЯЛАГІЧНЫ МЕТАД АПРАЦОЎКІ АЗІМАЙ САЛОМЫ

Сярод існуючых спосабаў хімічнай апрацоўкі грубых кармоў асаблівае становішча займае апрацоўка азімай саломы хіміка-біялагічным метадам, распрацаваным Інстытутам хіміі Акадэміі навук БССР. Паводле гэтага метаду, спачатку салому ператвараецца ў муку і падвяргаецца саляна-кісламу гідролізу, што прыводзіць да накісленага ў ёй цукраў, затым праводзіцца збражванне ацукранай саломы кармавымі дрожджамі.

Кіслотная варка і збражванне сечкі праводзіцца ў чанах, якія маюць вышыню 1,7 метра, дыяметр 1,5 метра і герметычна падагнаную накрыўку. У накрыўцы ёсць круглая адтуліна, праз якую праходзіць шланг, які злучае кармазапарнік з чанам. Шланг павінен даходзіць да самога дна чана, каб кіпэнне пры варцы адбывалася ва ўсім чане знізу даверху.

Пры загрузцы ў чан здробленай масы грубых кармоў улічваецца іх вага. Яны заліваюцца пяціразовай колькасцю воднага раствору салянай кіслаты. Моцнасць раствору салянай кіслаты — 0,1 працэнта. Прадажная саляная кіслата мае моцнасць 33—34 працэнты. Для атрымання раствору моцнасцю 0,1 працэнта на кожны 100 літраў вады дадаюць 300 грамаў салянай кіслаты. Такім чынам, на кожны цэнтнер апрацоўваемай саломы выдаткоўваецца 1,5 кілаграма салянай кіслаты. Варка працягваецца тры гадзіны з моманту прапускання пары.

Варка сечкі ў раствору салянай кіслаты павінна адбывацца толькі ў драўлянай тары, а пара ў гэтую тару павінна быць падведзена з дапамогай гумавага шланга. Металічныя чаны і трубы не павінны ўжывацца, бо саляная кіслата будзе разбураць іх.

У выніку правядзення кіслотнага гідролізу (варкі) у грубых кармах значна павышаецца ўтрыманне цукраў, якія выкарыстоўваюцца для вырошчвання кармавых дражджэй. У якасці крыніцы азоту і фосфару, неабходных для развіцця кармавых дражджэй, у масу ацукранага корму дадаюць на кожны цэнтнер водную выцяжку, зробленую з 150 грамаў суперфасфату і 80 грамаў сернакіслага амонія.

Правядзенне збражвання ацукраных грубых кармоў забяспечвае накісленае ў іх бялку ў выглядзе масы кармавых дражджэй. Маса ацукраных грубых кармоў пасля яе астывання да тэмпературы 30—32° Ц змяшчаецца ў чаны, прызначаныя для збражвання. Рэкамендуецца мець два брадзільныя чаны з тым, каб зброжаны корм, які знаходзіцца ў адным чане, выкарыстоўваўся для кармлення жывёлы, а ў другім чане адбываўся працэс бражэння. Каб кармавыя дрожджы хутка размнажаліся, у масу ацукранага корму павінна бесперабойна паступаць паветра. У электрыфікаваных гаспадарках для гэтай мэты выкарыстоўваецца паветрадуўка, якая прыводзіцца ў рух з дапамогай электраматора. Паветрадуўка падае паветра па трубах на дно брадзільнага чана. На дне ёсць спіральна сагнуты плоскі змеявік, зроблены з трубы з адтулінамі 3 міліметры ў дыяметры, праз якія выходзіць паветра, што напампоўваецца паветрадуўкай.

Гэты метад апрацоўкі азімай саломы паспяхова ўжываўся ў 1956 годзе ў калгасе імя Тэльмана Заслаўскага раёна. Салому разам з ільнянай мякінай (1:1) здрабнялася на універсальнай кормадрабілцы «ДКУ-1,2» у муку. Атрыманая мука змяшчалася ў запарнік і залівалася 0,1-працэнтным водным раствором салянай кіслаты. Запарнік злучаўся шлангам з параўтваральнікам, і кіслотная апрацоўка мукі з саломы пад уздзеяннем пары працягвалася 3—4 гадзіны з моманту прапускання пары. Пасля гэтага набракшая маса саломы і мякіны ахалоджвалася да тэмпературы 32° Ц і змяшчалася ў чаны для збражвання. Працэс збражвання працягваўся 20 гадзін пры тэмпературы 25—27° Ц. У выніку такой апрацоўкі ў кармавой сумесі за кошт дражджэй збіралася да 10 працэнтаў бялку. Каровам давалі такога корму да 25 кілаграмаў на галаву ў суткі. Пры гэтым надой павысіўся на 200—300 грамаў у суткі.

ЯК РЫХТУЮЦА СЕННАЯ МУКА І ВІТАМІННАЕ СЕНА

У якасці вітаміннай падкормкі для свіней і птушкі ўстойлівы перыяд ужываецца сенная мука. Добрая сенная мука па пажыўнасці блізкая да канцэнтратаў. Даюць яе ў сумесі з канцэнтратамі або варанай бульбай. Увядзенне сэннай мукі ў рацыён павышае прыбаўленне ў вазе парасят і яйканоскасць курэй на 10—15 працэнтаў. Парасятам-сысунам даюць яе па 30—60 грамаў, аднятым ад маткі — 200—500 грамаў, дарослым свінням — да 3,5 кілаграма, курам — па 10—20 грамаў у суткі на галаву. Вітаміннае сена рыхтуюць з бабовых траў: канюшы-

ны, вікі, сумесі збожжавых і бабовых. Травы скошваюцца перад пачаткам цвіцання, калі ў іх утрымліваецца максімальная колькасць пажыўных рэчываў і вітамінаў, асабліва правітаміна «А» (караціну). Сена лепш сушыць на ветры, у ценю на азяродах, бо доўгая сушка на сонцы прыводзіць да разбурэння караціну. У сонечныя дні вітаміннае сена можна сушыць у копах.

Высокапажыўная мука атрымліваецца пры штучнай сушцы сена, якая праводзіцца ў спецыяльных сушылах пры высокіх тэмпературах. Такая сушка зводзіць да мінімуму ўсялякія страты механічнага і біяхімічнага характару, якія маюць месца пры ўборцы сена.

Кармавая каштоўнасць сенай мукі залежыць не толькі ад якасці сена, з якога яна выраблена, але і ад ступені яго размола. Велічыня часцінак пры размоле павінна быць не большай чым 2,0—2,5 міліметра.

Сенная мука рыхтуецца на малатковых кормадрабілках, на ўніверсальным млыне «МДУ-4», а таксама на ўніверсальнай кормадрабілцы «ДКУ-1,2». Пры размоле на малаткавай кормадрабілцы сена папярэдне прапускаюць праз сячкарню. Муку рэкамендуецца хаваць у прасаваным выглядзе або шчыльна набітай у мяшках, складзеных у закрытым, сухім памяшканні. У вільготным памяшканні ссыпаная рыхлым пластам мука траціць вітаміны і пажыўнасць.

Добрую сенную муку не рэкамендуюць заварваць і запарваць, каб пазбегнуць разбурэння ў ёй вітамінаў. Пры скормліванні гэтую муку часцей за ўсё змешваюць з канцэнтратамі, увільгатняюць, пасля чаго даюць сумесі пастаяць 2—4 гадзіны. За гэты час мука размякчаецца. Сенную муку можна змешваць з сіласам, варанай бульбай і здробненымі караняплодамі.

ЯК РЫХТАВАЦЬ СЕННЫ НАСТОЙ

Для падрыхтавання сенага настою дабраякасную сенную пацяруху або сечку з сена лепшай якасці заліваюць вадой з разліку 6—7 літраў на 1 кілаграм масы. Калі сена пыльнае, дык перад здрабненнем яго ператрахваюць і прапалоскваюць у халоднай вадзе.

Існуюць два спосабы падрыхтавання настою. Пры адным спосабе сечку з сена змяшчаюць у чыстую бочку і заліваюць гатаванай вадой (70—80° Ц). Пасуду добра закрываюць і вытрымліваюць настой 10—15 гадзін, зрэдку памешваючы яго.

Затым настой, даведзены да тэмпературы 35—38° Ц, працэджваюць праз марлю і адразу ж даюць жывёле. Для паляпшэння смакавых якасцей на кожны літр настою дадаюць 1 грам кухоннай солі (рыс. 6). Пры другім спосабе сечка з сена заліваецца гатаванай вадой і разам з пасудзінай ставіцца ў кацёл з вадой, якая кіпіць, закрываецца накрыўкай і вытрымліваецца пры тэмпературы 80° Ц 5—6 гадзін. Пасля гэтага яна настойваецца ў закрытай пасудзе на працягу сутак. Перад скормліваннем настой працэджваюць праз марлю і даводзяць да тэмпературы 35—38° Ц. Для падрыхтавання сенага настою карыстаюцца чыстай пасудай. Яго нельга хаваць больш чым суткі, а летам — больш чым 4—5 гадзін.



Рис. 6. Падрыхтаванне сенага настою.

Сенны настой можа замяніць вадку або ўжывацца для замешвання кармоў. Цялятам рэкамендуецца даваць як дадатковы корм да малака, пачынаючы з 15-га —

21-га дня пасля нараджэння, па 250 грамаў на галаву ў суткі. У двухмесячным узросце гэтую норму павялічваюць да 3,5 літра. Сенны настой можна ўжываць для кармлення свіней. Парасятам на санным настоі замешваюць мучністыя канцэнтраты і вараную бульбу. Як паказвае вопыт перадавікоў жыўлагадоўлі, сенны настой з'яўляецца добрым дыетычным сродкам, паляпшае апетыт у жывёлы, садзейнічае папярэджанню страўнікава-кішэчных хвароб.

Б-НА АКАДЕМИИ
С-Х НАУК БССР
Инв. № 3636

ПАДРЫХТОУКА ДА СКОРМЛІВАННЯ ХВАЁВЫХ ЛАПАК

Калі ў гаспадарцы няма дастатковай колькасці паўнаценных кармоў, багатых вітамінамі і мінеральнымі рэчывамі, дадаткова да асноўных кармоў у якасці вітамінных падкормак могуць быць выкарыстаны лапкі сасны, елкі або ядловец. Паводле даных Латвійскага навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі і ветэрынарыі, у лапках хваёвых дрэў ёсць шмат вітамінаў «С», «К», правітаміну «А» (караціну) і мінеральных рэчываў (гл. табліцу 2).

Табліца 2

Вітамінная каштоўнасць свежых ігліц

Від ігліц	Карацін	Вітамін К	Рыба- флавін	Вітамін С
	міліграмаў на кілаграм			
Зялёныя яловыя ігліцы	50—120	12	5	2 500
Зялёныя сасновыя ігліцы	60—130	20	5	3 000
Ігліцы ядлоўца	100—200	—	6	2 500

Хваёвыя ігліцы і лапкі ўжываюцца галоўным чынам пры кармленні маладняку авечак, свіней і птушкі.

Птушкам ігліцы даюць у свежым выглядзе. Для гэтага зразаюць малыя зялёныя лапкі таўшчынёй ля зрэзу не больш чым 3 міліметры. Здрабняць іх лепш за ўсё ў марозны час на сячкарні да велічыні не больш чым 3 міліметры і адразу даваць птушкам у выглядзе мешанак. Курам даюць іх па 5—7 грамаў, качкам — 10—15 грамаў, гусям — 30 грамаў на галаву ў суткі. У адрозненне ад іншай жывёлы авечкі і козы зімой з ахвотай ядуць кару саміх лапак і ігліцы і тым самым задавальняюць сваю патрэбу ў вітамінах. Ім мэтазгодна даваць хваёвыя лапкі ў выглядзе звязаных пучкоў. Такая падкормка авечак свежымі лапкамі і ігліцамі ў эксперыментальнай гаспадарцы Беларускага навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі «Зарэчча» зімой 1957 года дала добры вынік. Лапкі сасны даваліся авечкам на выгуле ўволю, і яны з ахвотай елі ігліцы сасны і кару.

Маладняку сельскагаспадарчай жывёлы можна даваць хваёвую муку, якая рыхтуецца наступным чынам: яловыя або сасновыя лапкі падсушваюць пры пакаёвай тэмпературы і абры-

ваюць з іх ігліцы, якія дасушваюць у печцы пры тэмпературы 40—60° Ц. Затым ігліцы здрабняюць у муку. Гэтую муку можна ўводзіць у рацыён цялят, ягнят і парасят у колькасці 0,6—1 грама на кілаграм жывой вагі.

Не менш важнае значэнне мае і ўжыванне хваёвага настою. Ён узбуджае апетыт і робіць дабратворны ўплыў на абмен матэрыі ў арганізме. Пры дачы хваёвага настою быкам-вытворнікам у іх паляпшаецца якасць семя, яны лепш ідуць у злучку. У растуцага маладняку хваёвы настой забяспечвае добры рост, развіццё і здароўе. Асабліва ён карысны пры паносе цялят.

Хваёвы настой рыхтуюць так. Малыя лапкі сасны, елкі, ядлоўцу здрабняюць на сіласарэзцы. Масу змяшчаюць у чан або кадушку і заліваюць гарачай вадой пры тэмпературы 70—80° Ц з разліку 10 літраў на адзін кілаграм здробненых лапак. Чан або кадушку закрываюць і пакідаюць стаяць у цёплым памяшканні на працягу трох-чатырох гадзін. Пасля гэтага настою працэджваюць праз марлю. Да хваёвага настою жывёлу прывучаюць паступова, пачынаючы з малых доз. Буйнай рагатай жывёле даюць да шасці літраў, дарослым свінням і авечкам — да трох літраў, цялятам, ягням і парасят, якім больш як тры тыдні, — да аднаго літра ў суткі на галаву. Настой рэкамендуецца даваць жывёле перыядычна. Пасля двух-трохтыднёвага скормлівання робяць перапынак на 10—15 дзён. Для свіней на хваёвым настоі можна замешваць канцэнтраваныя кармы.

ПАДРЫХТОУКА САКАВІТЫХ КАРМОЎ І АДХОДАЎ ТЭХНІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

Да групы сакавітых кармоў адносяцца караняплоды, клубеньяплоды, сілас-і некаторыя вадзяністыя адходы тэхнічнай вытворчасці. Гэтыя кармы характарызуюцца высокім утрыманнем вады. У каранеклубеньяплодах шмат крухмалу і цукраў. Сілас з зялёных раслін багаты вітамінамі і некаторымі мінеральнымі рэчывамі. У зімовы стойлавы перыяд пры дапамозе гэтай групы кармоў можна крыху наблізіць зімовае кармленне жывёлы да летняга і забяспечыць высокую прадуктыўнасць. Значыць, зімой ні адзін рацыён не павінен складацца без сакавітых кармоў. Для павышэння паядання і лепшага выкарыстання сакавітых кармоў яны павінны быць перад скормліваннем падрыхтаваны.

ПАДРЫХТОўКА ДА СКОРМЛІВАННЯ КОРАНЕКЛУБЕНЯПЛОДАў

Найбольш простым прыёмам падрыхтоўкі коранеклубеня-плодаў да скормлівання з'яўляецца ачыстка іх ад зямлі, гразі і ад сапсаваных загниўшых частак. Гнілыя і пакрытыя плесняй коранеклубеняплоды ў корм жывёле непрыдатныя. Пакрытыя зямлёй коранеклубеняплоды неабходна мыць, а марожаныя — адтайваць у халоднай вадзе. Каровам, авечкам і коням коранеклубеняплоды даюцца ў сырым выглядзе. Тэмпература іх пры скормліванні павінна быць роўная тэмпературы памяшкання. Для маладняку коранеклубеняплоды неабходна здрабняць і даваць іх у сумесі з іншымі кармамі. Здрабняюць коранеклубеняплоды перад скормліваннем, бо ў здробненым выглядзе яны хутка цямнеюць і псуюцца.

Пры кармленні свіней з самакармушак бульбу даюць у сырым цэлым выглядзе. Пры кармленні мешанкамі бульба варыцца або запарваецца ў кормазапарніках ці ў кормапрыгатавальным камбайне. Варыць і запарваць праросшую бульбу абавязкова, бо ў гэтых клубнях ёсць ядавітае рэчыва — саланін (да 0,5 працэнта). Варка і запарванне разбурае гэтае рэчыва. Ваду, у якой варылася такая бульба, неабходна зліваць. Вараныя коранеклубеняплоды трэба выкарыстоўваць у той жа дзень, інакш яны могуць пракіснуць і сапсавацца. Напрыклад, нясвоечасовае выкарыстанне вараных буракоў і іншых караняплодаў можа выклікаць атручванне жывёлы.

У караняплодах, вырашчаных на добра ўгноеных салетрай палях, шмат нітратаў. Пры павольнай варцы і астыванні звараных буракоў і іншых караняплодаў на працягу 5—12 гадзін пад уздзеяннем дэнітрафіцуючых бактэрый з нітратаў у іх утвараюцца ядавітыя рэчывы, якія могуць выклікаць, галоўным чынам у свіней і буйнай рагатай жывёлы, цяжкія формы страўнікава-кішечных хвароб, тымпаніт (уздуцце страўніка), хісткую паходку і паралічы. Таму пасля варкі правараных буракі, бручку і турнэпс доўгі час нельга пакідаць у катлах і запарных чанах.

ПАДРЫХТОўКА ДА СКОРМЛІВАННЯ СІЛАСУ

Сілас з'яўляецца добрым кормам для ўсіх відаў сельскагаспадарчай жывёлы. Увядзенне яго ў зімовы рацыён жывёлы робіць спрыяльным уплыў на здароўе жывёлы і павышэнне прадукцыйнасці. Аднак каштоўнасць сіласу як кармавога сродку можа аказацца вельмі нізкай, калі не выконваць асноўных правілаў

падрыхтоўкі яго да скормлівання. Перад скормліваннем неабходна пераканацца ў дабраякаснасці сіласу. Добры сілас павінен мець колеры ад светлазялёнага да цёмназялёнага, захаваўшую структуру расліннай сыравіны, прыемны хлебны, агурочны або яблычны пах. Сапсаваны ж сілас бывае брудна-чорнага колеру, мае непрыемны пах.

Пры даставанні сіласу трэба захоўваць наступныя ўмовы. Ямы, вежы і паўвежы адкрываюцца гарызантальнымі пластамі, а траншэі і бурты — вертыкальнымі. Адразаць пласты сіласу трэба вострай рыдлёўкай па меры яго скормлівання. Віламі вымаць сілас не трэба, бо гэта глыбока разрыхляе паверхню яго, і ён хутка псуецца ад пранікнення паветра. Сілас трэба вымаць са сховішча ў такой колькасці, каб яго скарміць у адну дачу або на адны суткі. Пасля зняцця пласту сіласу сіласасховішча павінна быць шчыльна закрыта драўлянымі шчытамі альбо саламянымі матамі для папярэджання ад прамярзання.

Пры перавозках сіласу зімой яго таксама неабходна закрываць саломай, ахоўваючы ад замярзання. Працяглае знаходжанне сіласу ў стане замярзання прыводзіць да страты пажыўных рэчываў і да яго псавання. Мёрзлы сілас даваць жывёле забараняецца. Але калі сілас захаваць не ўдалося і ён прамёрз, дык яго трэба спачатку адтаяць і затым даць жывёле. Нельга хаваць сілас у кармушках і праходах скаціннага двара, бо яго пах лёгка перадаецца ў малако кароў.

ПАДРЫХТОўКА ДА СКОРМЛІВАННЯ БРАГІ І ЖАМЕРЫНАў

Брага — гэта адходы спіртэгарэлачнай вытворчасці. Збожжавая брага па пажыўнасці ў два разы вышэйшая за бульбяную. Свежую брагу можна даваць у чыстым выглядзе або ў сумесі з грубымі кармамі. Брага хутка псуецца, і яе трэба сіласаваць, пры гэтым у чыстым выглядзе або ў сумесі з сечкай і мякінай. Пры сіласаванні ў чыстым выглядзе яна заліваецца ў ямы або траншэі. Пасля адстойвання верхні слой вады зліваецца, і брага робіцца больш пажыўнай, гэта значыць у ёй менш вады. Пры сіласаванні ў сумесі з грубымі кармамі на адну вагавую частку здробненых грубых кармоў бяруць 3—4 часткі свежай брагі. Пры скормліванні брагі трэба старанна сачыць за чыстай кармушкай і перыядычна іх дэзінфіцыраваць аднапрацэнтным растворам вапны. Брага шырока выкарыстоўваецца пры кармленні дойных кароў і адкорме буйнай рагатай жывёлы.

Бураковыя жамерыны з'яўляюцца адходам бурачна-цукровай вытворчасці. Яны шырока выкарыстоўваюцца пры адкорме буйнай рагатай жывёлы. У свежых жамерынах утрымліваецца да 90 працэнтаў вады, мала бялку і мінеральных рэчываў. Таму пры кармленні жамерынамі ў сутачны рацыён неабходна ўводзіць канцэнтраты і добрае сена. Для лепшага хавання жамерынаў іх сушаць або сіласуюць. Высушаныя жамерыны робяцца транспартабельнымі і добра захоўваюцца. Даваць іх жывёле без папярэдняй падрыхтоўкі забараняецца, бо яны часам вельмі набухаюць у страўніку і выклікаюць калаціц. Таму перад скормліваннем сухія жамерыны на працягу 5—6 гадзін вымочваюць у цёплай вадзе. На адзін кілаграм жамерынаў бяруць 3 літры вады.

У свежых бурачных жамерынах вельмі мала цукру, таму ў чыстым выглядзе яны дрэнна сіласуюцца. Для лепшага сіласавання да іх дадаюць 1—2 працэнт кармавой патакі або 30—40 працэнтаў караняплодаў ці зялёнай масы кукурузы. Для зніжэння вільготнасці свежыя жамерыны перад сіласаваннем крыху ўтрамбоўваюць.

Свежыя і сіласаваныя жамерыны выкарыстоўваюцца пры адкорме буйнай рагатай жывёлы. Дарослай жывёле на адкорме даюць да 70, дойным каровам — да 40 кілаграмаў на галаву ў суткі. Да такіх дач жамерынаў жывёлу прывучаюць паступова.

ПАДРЫХТОўКА КАНЦЭНТРАВАНЫХ КАРМОў

Група канцэнтраваных кармоў па хімічнаму саставу і пажыўнасці разнастайная. Агульным для большасці канцэнтратаў, у адрозненне ад іншых кармоў, з'яўляецца тое, што яны ў малым аб'ёме ўтрымліваюць шмат пажыўных арганічных рэчываў, гэта значыць кармавых адзінак і страўнага бялку. Зернявыя кармы па пажыўнасці займаюць адно з першых месцаў сярод канцэнтратаў.

Са збожжавых у корм жывёле выкарыстоўваюцца авёс, ячмень, кукуруза, проса, сорга, радзей жыта і пшаніца, а з бабовых — гарох, віка, сачавіца, радзей лубін, соя. Насенне алейных культур у корм жывёле ўжываецца рэдка. Часцей за іншыя выкарыстоўваецца як дыетычны сродак адвар ільнянога семя. На 1 кілаграм семя бяруць 10 літраў гарачай вады і кіпяцяць 2 гадзіны, затым адвар ахалоджваюць і даюць цялятам. Шырока выкарыстоўваюцца пры кармленні жывёлы адходы алейнай прамысловасці — макуха і шроты.

Рацыянальнае выкарыстанне зернявых кармоў, іх адходаў непарыўна звязана з правільнай падрыхтоўкай да скормлівання. Падрыхтоўка зерня павышае страўнасць і біялагічную каштоўнасць пратэінаў. Здрабненне зерня палягчае яго перажоўванне і страўнасць. Здрабняць зерне можна драбленнем, размолам і шляхам плюшчэння. Здрабненне праводзіцца на малатковых драбілках «ДМК-0,1» або «ДММ-0,3», жорнавым млыне «ММЖ-0,5», універсальным млыне «МДУ-4» або «УМ-0,35» і здрабняльніку кармоў «ІК-3». Тонкі памол зерня рэкамендуецца для свіней, больш буйны (да 4 міліметраў) — для буйнай рагатай жывёлы і самы буйны — для коней. Коні добра ядуць груба здробненае і плюшчанае зерне. Дарослыя коні з ахвотай ядуць зерне аўса ў сумесі з саламянай сечкай. Здрабненыя кармы, багатыя тлушчам, напрыклад, авёс, кукуруза і інш., пры хаванні псуюцца, таму іх трэба выкарыстоўваць на працягу першых дзесяці дзён пасля размолу. Мучністыя кармы гіграскапічныя, іх неабходна хаваць у сухім халаднаватым месцы.

ЯК РЫХТУЮЦА БАўТУХА, КІСЕЛЬ І КАША

Баўтуху трэба рыхтаваць на вадзе, малаце або адгоне. Пры гэтым мучністыя кармы абліваюць вадой з разліку адна частка мукі на 5 частак гарачай вады або малака. Сумесь добра размешваюць, затым яшчэ дадаюць столькі ж вады або малака. Усяго бяруць вады або малака і мукі ў прапарцыі 1:10. Пасля паўторнага прыбаўлення вады або малака баўтуху перамешваюць і хутка даюць жывёле, пакуль мучністыя часткі корму не аселяць на дно. Баўтуха пры доўгім хаванні псуецца, таму яе рыхтуюць толькі на адну дачу. Мучной баўтухай кормяць цялят і парасят у перыяд пераходу ад малочных да раслінных кармоў. Баўтуху часта даюць хворай жывёле. Карміць жывёлу доўгі час аднымі баўтухамі не рэкамендуецца, бо гэта прыводзіць да парушэння стрававання.

Аўсянае малако і кісель рыхтуюць для парасят і цялят у час ранняга прывучэння іх да раслінных кармоў. Для падрыхтавання аўсянага малака на 10 літраў вады пры тэмпературы 35—40° Ц бяруць 2—3 кілаграмы аўсянкі. Раствору даюць пастаяць 4—6 гадзін, затым фільтруюць праз марлю. Малако выпайваюць жывёле на працягу першых чатырох-пяці гадзін пасля падрыхтавання, бо яно хутка псуецца. Аўсяны кісель рыхтуецца з прасеянай аўсянай мукі. Аўсянку размешваюць у вадзе. На 1 кілаграм аўсянкі бяруць 2,5 літра вады і вытрымліваюць 2 гадзіны. Затым раствор, памешваючы, кіпяцяць да гу-

статы кісялю. Аўсянае малако і кісель трэба рыхтаваць у луджанай металічнай пасудзе. Парасятам і цялятам у малочны перыяд дачу аўсянага малака і кісялю пачынаюць з 50—100 грамаў і паступова даводзяць да аднаго-двух літраў у суткі.

Кашы з драблёнага зерня рыхтуюцца пераважна для парасят-сысуноў. Колькасць вады або адгону і драблёнага зерня ці круп для кашы бярэцца з разліку 1:1. Да гатовай, разбаўленай вадой, адгонам або малаком кашы дадаюць кармы жывёльнага паходжання. Баўтухі, кісель і кашы ўводзяцца ў рацыён па заключэнні спецыялістаў гаспадаркі ў залежнасці ад узроста-вых груп, як дыетычны і лячэбны корм.

ВАРКА, ПРАПАРВАННЕ І ПАДСМАЖВАННЕ ЗЕРНЯ

Варыць і прапарваць рэкамендуецца зерне бабовых. Яго размочваюць у вадзе 5—6 гадзін, затым вараць або прапарваюць на працягу гадзіны. У выніку зерне набракае і разварваецца ў кашу. Гэта павышае яго страўнасць і біялагічную каштоўнасць, а таксама абясшкоджуе зерне ад плесні і шкодных мікробаў. Такая падрыхтоўка кармоў часцей за ўсё практыкуецца ў свінагадоўлі. Запаранае зерне павінна складаць не больш чым палавіну ўсёй сутачнай нормы канцэнтратаў. Парасятам-сысунам з 5—7-дзённага ўзросту даюць падсмажаны ячмень. Перад падсмажваннем зерне замочваюць, затым рассыпаюць тонкім пластам на жалезны ліст і падсмажваюць пры тэмпературы 120—130° Ц да таго часу, пакуль яно не пабурэе. Пасля падсмажвання зерне робіцца крохкім, пахучым, яго крухмал часткова пераходзіць у дэкстрын і цукар. Парасятам даюць падсмажанае зерне ў невялікай колькасці.

АБЯЗГОРЧВАННЕ ЗЕРНЯ ЛУБІНУ

Зерне горкага лубіну багата бялком. Яно з'яўляецца каштоўным кормам. Аднак у ім ёсць горкія ядавітыя рэчывы — алкалоіды, якія могуць выклікаць атручванне жывелы. Таму даваць жывёле зерне горкага лубіну без папярэдняй падрыхтоўкі забараняецца. Абязгорчванне зерня праводзіцца шляхам вышчалачвання. Зерне горкага лубіну на працягу сутак вымочваецца ў вадзе. Затым набракшыя зёрны змяшчаюць у кармазапарнік або кацёл, прапарваюць на працягу адной-двух гадзін. Пасля гэтага зерне выгружаюць у крацістыя скрыні або кошы-

кі і трымаюць у іх на працягу сутак у цякучай вадзе. Калі пямачымасці вышчалачвання ў цякучай вадзе, дык зерне лубіну пасля прапарвання можна змяшчаць у чан або бочку з вадой на двое сутак і ваду змяняць 1—2 разы. Вымачанае абязгорчанае зерне лубіну можна даваць жывёле на працягу сутак, бо пры хаванні яно хутка псуецца. Каровам даюць яго да чатырох кілаграмаў, а коням і буйнай рагатай жывёле на адкорме — да пяці кілаграмаў у суткі на галаву.

У 1957 годзе на эксперыментальнай базе Беларускага навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі «Зарэчча» распаранае і абязгорчанае зерне горкага лубіну сіласавалася ў сумесі з варанай бульбай з разліку 1:1 і 1:2. Зімой бульбяны сілас з зернем лубіну давалі свінням у час адкорму. Свінні з ахвотай елі яго (кожняя з'ядала да шасці кілаграмаў у суткі) і давалі высокае прыбаўленне ў вазе без дачы іншых канцэнтраваных кармоў.

ПАДРЫХТОўКА МАКУХІ ДА СКОРМЛІВАННЯ

Макуху перад скормліваннем неабходна здрабняць на макухадрабілцы або малатковай драбілцы. Для свіней макуху здрабняецца ў муку. Здробненая макуха даецца жывёле ў сумесі з іншымі кармамі. У бавоўнавай макусе і шпроце ёсць ядавітае рэчыва — гасіпол, якое можа выклікаць атручванне жывёлы. Часта макуха і шрот абясшкоджуецца на заводах, а часам паступаюць без апрацоўкі. Разбурэнне гасіпола праводзіцца шляхам прапарвання здробленай макухі ў кармазапарніках або варкай у катле на працягу двух гадзін. Добрыя вынікі атрымліваюцца тады, калі пры запарванні да макухі дадаюць каля 10 працэнтаў мучністых кармоў — вотруб'я або кармавой мукі. Жывёлу прывучаюць да бавоўнавай макухі паступова. Пры працяглым кармленні ёю праз тры месяцы робяць перапынак на 30 дзён. Гэтай макухі даюць свінням у суткі да 300 грамаў на галаву (паросным не). Дойным каровам можна даваць абясшкоджанай бавоўнавай макухі або шроту да трох кілаграмаў, авечкам — да 250 грамаў у суткі на галаву.

УЖЫВАННЕ МІНЭРАЛЬНЫХ ПАДКОРМАК

У зімовых рацыёнах жывёлы часта не хапае неабходных мінеральных рэчываў. Кароткачасовы недахоп мінеральных солей у рацыёне выклікае парушэнне абмену матэрыі і зніжэнне прадуктыўнасці жывёлы, а працяглы недахоп мінеральных рэчываў прыводзіць да ялавасці, бясплоднасці, затрымкі росту ў

маладой жывёлы і да розных хвароб. Большасць мінеральных падкормак даецца жывёле ў драблёным выглядзе з канцэнтратамі і іншымі кармамі.

З мінеральных дабавак найбольш распаўсюджаны крэйда, вапна, кухонная соль, прэцыпітат, касцявая мука, трыкальцый-фасфат, сернакіслае жалеза.

Амаль усе раслінныя кармы бедныя хлорам і натрыем. Таму жывёла мае патрэбу ў дадаванні да іх рацыёна кухоннай солі. Свінні і птушка маюць меншую патрэбу ў кухоннай солі, чым іншая жывёла. Каровам, коням і авечкам соль даюць у выглядзе лізунца. Лічаць, што буйнай рагатай жывёле неабходна ў сярэднім даваць 25—50 грамаў кухоннай солі ў суткі на галаву, коням — 20—40, авечкам і свінням — 5—15 грамаў.

У радзе раёнаў, дзе глеба і вада бедныя ёдам, неабходна даваць жывёле ядзіраваную кухонную соль, у якой ёсць 5 мілі-грамаў ёдзістага калія на 1 кілаграм кухоннай солі. Кальцыевыя падкормкі патрэбны жывёле тады, калі даюць ёй вялікую колькасць сіласу, коранеклубеньяплодаў, жамерынаў або сало-мы. У крэйдзе і гашанай вапне ёсць да 40 працэнтаў кальцыя. Крэйду і старагашаную вапну папярэдне раздробняюць і два-тры разы адмочваюць, гэта значыць заліваюць вадой у бочцы, добра перамяшваюць, пасля адстойвання брудную ваду зліва-юць. Затым чыстую крэйду або вапну, што аселі на дне, высуш-ваюць і даюць жывёле ў сумесі з канцэнтратамі або іншымі кармамі. Крэйды буйнай рагатай жывёле даюць да 100 грамаў у суткі, свінням — да 50 грамаў. Лепшай з фосфарных падкор-мак з'яўляецца фосфарнакіслы кальцый, або прэцыпітат.

У касцявым прэцыпітаце ёсць каля 29 працэнтаў кальцыя і 23 працэнты фосфару. Буйнай жывёле даюць яго па 30—50 грамаў, а маладняку і свінням — па 8—20 грамаў у суткі.

Касцявую муку і трыкальцый-фасфат жывёла ёсць крыху горш, чым прэцыпітат. У іх ёсць каля 30 працэнтаў кальцыя і 14 працэнтаў фосфару. Яны ўжываюцца, таксама як і прэцы-пітат, пры недахопе ў рацыёне фосфару і кальцыя.

Драўняны вугаль, асабліва бярозавы, з'яўляецца добрым дыетычным-кормам пры паносах свіней і птушак. Ён садзей-нічае правільнаму страваванню і паляпшае засваенне кармоў. Парасятам вугаль даюць у здробненым выглядзе да 0,5—1 пра-цэнта ад вагі сухога рэчыва рацыёну.

Драўняны попел (бярозы, дуба, елкі, сасны, мае каля 21 працэнта кальцыя і 1,5 працэнта фосфару. Попел перад скормліваннем павінен быць прасеяны праз ча-стае рэшата і ачышчаны ад пабочных прымесьяў. Яго можна

даваць буйнай рагатай жывёле і свінням да 100 грамаў у суткі ў сумесі з канцэнтраванымі кармамі.

Недахоп жалеза ў корме ў першыя дні жыцця можа вы-клікаць у парасят анемію. Пры аліментарнай анеміі парасят, асабліва ў асенне-зімовы перыяд, у рацыён кармлення іх і пад-сосных матак па ўказанню ветработнікаў уводзяць дрэпарат хлорыстага кобальта. Для папярэджання аліментарнай анеміі ім неабходна з трэцяга-пятага дня жыцця ўводзіць у рацыён раствор сернакіслага жалеза з дадаваннем сернакіслай медзі. Раствор рыхтуюць так: у адным літры гатаванай вады раства-раюць 2,5 грама сернакіслага жалеза і 1 грам сернакіслай ме-дзі. Паколькі парасятам-сысунам цяжка даць гэты раствор з кормам, рэкамендуецца 3—4 разы ў суткі перад ссаннем змочваць ім саскі свінаматкі. Пазней, калі парасяты пачы-наюць есці, акрамя малака, іншыя кармы, растворам серна-кіслага жалеза можна абліваць кармы з разліку дзве стало-выя лыжкі ў суткі на ўвесь прыплод. Замест сернакіслага жалеза парасятам трэба даваць чырвоную гліну. Чырвоная гліна багатая жалезам. Яна здабываецца на глыбіні 0,5—1 мет-ра. Забруджаную пяском і іншымі прымесьямі гліну ўводзіць у рацыён жывёлы нельга. Парасятам, пачынаючы з пятага-сё-мага дня пасля нараджэння, даюць гліну ў неабмежаванай колькасці.

САПУНОВ В. А.

На белорусском языке:

Подготовка кормов до скармливання.

Рэдактар Ф. Ляўша.

Выдавецтва «Звязда»

АТ 06831. Падпісана да друку 9-V-58 г. Фармат паперы
60X84¹/₁₆. Аб'ём 1,75 друк. арк. Зак. 110. Тыраж 10000 экз.
Бясплатна.

Мінск, РВ № 5 Паліграфістаў.